12/VIII/10.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 16:

P. Pape

BRITISH MUSEUM
NATURAL HISTORY

Brachyceridae.

Brachycerinae.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1910.

Fam. Brachyceridae.

Auct. **P. Pape.**

Aurivillius, Öfvers. af Vetensk.-Ak. Förh. XLII, 1885, p. 5—24. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 105—140, 482.

Brachycerides Jekel, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 541.
Brachycerinae Bovie (als Subfam. d. Curc.) in Wytsman, Gen. Ins. IC, 1909, p. 1—38, t. 1—3.

I. Subfam. Microcerinae.

Aurivillius, l. c. p. 6—20; Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar XXI, 15, 1887, p. 1—80.

Microcerides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 20.
Microcerinae Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 104.
Microcerini Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 2.

Episus Schoenh.

Schoenh. Disp. meth. 1826, p. 78; Gen. Curc. I, 1833, p. 374. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 22. — Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 104, 131. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 7; Sv. Vetensk.-Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 10. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 3.

Lagenisus Jekel (pars) l. c. p. 105.

aculeatus Imh. et Labr. Gen. Curc. I, 1838/42, nr. 25, t. 25. — Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 601. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 34, t. 3, f. 7.	Capland
var. *strictocollis* Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 119. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 35, t. 3, f. 8.	Capland, Orange-Fluß
angulicollis Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 54, t. 5, f. 9.	Kaffraria, Natal, Transvaal, Ost-Afrika?

angusticollis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 23, t. 2, f. 4. — Kaffraria, Transvaal

Bohemani Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 37, t. 3, f. 10. — Namaqua, Damara, Nolagi, Ovambo

brevicollis Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 117. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 29, t. 10, f. 2; t. 2, f. 10. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 3, f. 2, 3. — Damara, Delagoa-Bay, Transvaal

impressicollis Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11.

var. *nigrovittatus* Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 30 — Damara, Capland

cognatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 5. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 16, t. 1, f. 8. — Kaffraria

contractus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 6. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 36, t. 3, f. 9. — Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 417. — Kaffraria Transvaal, Capland, Hereroland

cyathiformis Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 376. — Jek. l. c. p. 106 *(Lagenisus)*. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 13, t. 1, f. 1—5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 1, f. 1; t. 3, f. 1. — Gambia, Senegal, Gabun, Ob.-Ägypt., Kaffraria, Transvaal

coenosus Jek. l. c. p. 107 *(Lagenisus)*.

var. *parallelus* Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 14, t. 1, f. 5. — Damara

var. *paucidentatus* Auriv. l. c. p. 15, t. 1, f. 3. — „

var. *Wahlbergi* Jek. l. c. p. 109 *(Lagenisus)*. — Auriv. l. c. p. 14, t. 1, f. 5. — Dtsch.-Südwestafrika

Devylderi Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 24, t. 2, f. 6. — Damara, Delagoa-Bay

Dohrni Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 33, t. 3, f. 4. — Kaffraria, Capland

dorsalis Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 7; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 15, t. 1, f. 6. — Kaffraria, Transvaal

Dregei Boh. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 595. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 48, t. 5, f. 1. — Capland

obliquus Jek. l. c. p. 113. — „

rostratus Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1790, p. 65, t. 1, f. 4. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 82, t. 101, f. 5.

echinatus Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 594. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII,, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 46, t. 4, f. 8. — „

elongatus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, p. 18, t. 1, f. 9. — „

Fahraei Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 24, t. 2, — Dtsch.-Südwestafrika,

f. 5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 4, t. 1, f. 2. — Damara

fictus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 597. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 52, t. 5, f. 7. — Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 416. — Capland, Kaffraria

flexuosus Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 599. — Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 4. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 53, t. 5, f. 8. — Capland, Natal, Transvaal, Kaffraria

ganglionicus Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 603. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 34, t. 3, f. 5, 6. — Kaffraria

gibbosus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 42, t. 4, f. 3. — Capland

var. *Krebsi* Auriv. l. c. p. 42, t. 4, f. 4. — Kaffraria

gravidus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 30, t. 2, f. 11. — Vaal-Fluß

hieroglyphicus Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 3. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 25, t. 2, f. 7. — Kaffraria, Transvaal, Delagoa-Bay, Süd-Africa

Hopei Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 600. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 32, t. 3, f. 2. — Capland

var. ? Auriv. l. c. p. 33, t. 3, f. 3.

hypocritus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 375. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 50, t. 5, f. 4. — „

cristatus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 596. — Auriv. l. c.

inermicollis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 590. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 28, t. 3, f. 1. — „

dentatus Boh. l. c. V, 2, p. 592. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 11; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 29. — Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1909, p. 416. — Namaqua

mendosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 377. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 19, t. 1, f. 11. — Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 417. — „

muricatus Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 598. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 49, t. 5, f. 2. — Capland

var. *dubius* Auriv. l. c. p. 50, t. 5, f. 3. — Kaffraria

nodicollis Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 45, t. 4, f. 7. — Capland, Kaffraria

Oberthüri Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 12; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 37, t. 3, f. 11. — Senegal, Casamanca

opalinus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 28, 87, t. 2, f. 9. — Capland

Peringueyi Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 21, t. 2, f. 2. — Capland, Orlog-Fluß

punctatus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 51, t. 5, f. 5. — Capland, Grahamstown

quadrulifer Jek. l. c. p. 115. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 55, t. 10, f. 1. — Capland

robustus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 10; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 27, t. 2, f. 8. — „

Roelofsi Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 44, t. 4, f. 6. — „

* **rostratus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 194. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 32. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 43. — „

albulus Lacord. Gen. Col. VI, 1863 (Expl. des pl. p. 21), t. 61, f. 1.

Thunbergi Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 591. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 43, t. 4, f. 5.

rotundicollis Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 41, t. 4, f. 2. — „

simulator Dalm. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 377. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 593. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 20, t. 20, f. 1. — Patria?

spinosus Boh. l. c. V, 2, 1840, p. 602. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 13; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 40. — Capland

var. ? Auriv. l. c. p. 40, t. 4, f. 1. — „

sputatilius Gyll. l. c. I, 1833, p. 378. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 14; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 46, t. 4, f. 9. — „

T-album Jek. l. c. II, 1875, p. 11. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 51, t. 5, f. 6. — Damara, Capland

tenuis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 310. — Ost-Afrika

truncatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 374. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 19, t. 1, f. 10. — Capland

tuberosus Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 68; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 217. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 8; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 16, t. 1, f. 7. — Uru, Zanzibar, N'Gami, Abessinien

Westermanni Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 9; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 22, t. 2, f. 3. — Capland

44

Microcerus Schoenh.

Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 441. — Imhoff & Labram, Gen. Curc. II, 1846, p. 17. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 23. — Jekel, Col. Jek. II, 1875, p. 132. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 6, 16; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 56. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 6.

abyssinicus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 33. — Choa

* type species (mon.): Billberg 1820:40

albiventer	Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 84; Peters' Reise 1862, p. 308. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 66, t. 7, f. 2.	Mosambik, Zambesi, Delagoa-Bay
annuliger	Har. Monatsb. Berl. Akad. XLV, 1880, p. 265. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 65, t. 7, f. 1.	Sansibar
Besckei	Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 729. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 71, t. 7, f. 8.	Mosambik
Borrei	Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 67, t. 7, f. 4.	Südwest-afrika
cavirostris	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 312. — Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XV, 1895, p. 397. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 482.	Ostafrika
costalis	Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 7. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 73, t. 7, f. 10. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 7, t. 1, f. 3; t. 3, f. 7.	Kaffraria, Transvaal, Damara
cretaceus	Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 727. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78.	Kaffraria
cribellatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 312. — Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 482.	Ost-Afrika
depressus	Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 71, t. 1, f. 7.	Kaffraria
dorsofumatus	Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 147, 311. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 79.	Ost-Afrika
Dregei	Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 725. — ?Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 60.	Capland
Fahraei	Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 121. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 73, t. 10, f. 4. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 7, t. 1, f. 5.	N'Gami, Süd-Afrika
	var. *?sulcifrons* Auriv. l. c. p. 73, t. 8, f. 1.	Delagoa Bay
fallax	Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 8. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 64, t. 7, f. 5.	Kaffraria
fissirostris	Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 313.	Ostafrika
fossilis	Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61, t. 6, f. 6, 7.	Delagoa Bay
	Kirschi Auriv. (non Jek.) Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 18; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61.	
grisescens	Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 728. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 17. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 70, t. 8, f. 3.	Capland

idolum Gyll. l. c. I, 1833, p. 443. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 61, t. 6, f. 3. — Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 416. — Capland, Transvaal, Hereroland

Dregei Lacord. Gen. Col. VI, 1863, t. 61, f. 2. — Auriv. l. c.

inaequalis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 730. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78, t. 8, f. 4, 5. — Capland

interstitiopunctatus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 75, t. 7, f. 9. — Transvaal

Kirschi Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 125. — Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 62, t. 10, f. 5. — N'Gami

latipennis Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 6. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 62, t. 6, f. 2. — Bovie in Wytsm. IC, 1909, p. 7, t. 3, f. 5, 6. — Kaffraria, Capland, Damara, Transvaal

melancholicus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 726. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 15; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 78, t. 8, f. 6. — Capland

oblongus Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 77, t. 8, f. 7. — Namaqua

Pascoei Jek. Col. Jek. II, 1875, p. 121. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 74, t. 10, f. 3. — Damara

planifrons Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 74, t. 8, f. 2. — Transvaal, Kaffraria

retusus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1807, p. 415. — L. Syst. Nat. ed. XIII (*Gmelin*) I, 4, 1789, p. 1790. — Ol. Encycl. meth. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1807, 82, p. 62 t. 1, f. 6. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 83, t. 101, f. 5. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 442; l. c. V, 2, 1840, p. 724. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 59, t. 6, f. 8. — Capland

bimaculatus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 33.

ephippiatus Sparrm. Act. Holm. VI, 1785, p. 52, t. 3, f. 27.

var. *rotundatus* Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 60, t. 6, f. 4. — Kaffraria, Süd-Afrika

var. *spissus* Auriv. l. c. p. 59, t. 6, f. 5. — Kaffraria, Transvaal, Capland

spiniger Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 307, t. 18, f. 9 (nec f. 8!). — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 17; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 64, t. 6, f. 1. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 8, t. 1, f. 4. — Mosambik, Sansibar, Zambesi, Quango, Benguela

subcaudatus Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 307, t. 18, f. 8 (nec f. 9!). — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, — Mosambik, Transvaal, Kaffraria

Billberg 1820: 39

p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 72, t. 7, f. 6.

tuberifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 154. — Somaliland

tutanus Jek. l. c. p. 127. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 19; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 68, t. 7, f. 3. — Natal, Capland

vermiculatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 310. — Ost-Afrika

32

Gyllenhalia Auriv.

Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 79. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 8.

spectrum F. *(Curculio)* Spec. Ins. I, 1781, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 119. — L. Syst. Nat. ed. XIII *(Gmelin)* I, 4, 1789, p. 1789. — *(Brachycerus)* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth. II, 1807, p. 415. — Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1790, 82, p. 65, t. 1, f. 5. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 84, t. 101, f. 6. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 431. — *(Gyllenhalia)* Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 20; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 80, t. 9, f. 1, 2; Ent. Tidskr. 1888, p. 153. — Bovie, in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9, t. 1, f. 6; t. 3, f. 8, 9. — Capland

1

II. Subfam. Brachycerinae.

Aurivillius, Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21—23; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 81—84.

Brachycerides Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 283—286.
Brachycerides Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 119—212.
Brachycerini Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9—28.

1. Tribus: **Protomantini.**

Protomantinae Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 81.

Protomantis Schoenh.

Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 721. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 24. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 82. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 9.

Dregei Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 723. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, — Capland

p. 22; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 82, t. 9, f. 3—5. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 10, t. 1, f. 7; t. 3, f. 10.

elegans Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 83, t. 9, f. 8. — Capland

Peringueyi Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 21; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 84, t. 9, f. 6, 7. — „

3

2. Tribus: **Brachycerini.**

Brachycerinae verae Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22.
Brachycerinae Auriv. Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 81.

Theates Fåhrs.

Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 149. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27.

angusticollis Wiedem. *(Brachycerus)* Zool. Mag. II, 1823, p. 119. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 703. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
cristatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 163, t. 3, f. 14. — Marshall, l. c.
magus Auriv. Ent. Tidskr. 1888, p. 153, t. 2, f. 1—3. — Marshall, l. c. — Capland

ludificator Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 152, t. 2, f. 10—12. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27, t. 1, f. 8; t. 3, f. 16. — N'Gami

petiolatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 151, t. 2, f. 7—9. — Kaffraria

spectator Fåhrs. l. c. p. 68. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 22; Ent. Tidskr. 1888, p. 152, t. 2, f. 4—6. — „

4

Dyerocera Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 334. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.

gravida Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 334, t. 11, f. 9. — Transvaal

1

Euretus Péring.

Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 186. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27.

Aurivillii Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 186. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 28, t. 1, f. 9; t. 3, f. 17. — Capland

1

Brachycerus Ol.

Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 181. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 11. — Herbst, Käfer VII, 1799, p. 71. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 251. — Ol. Entom. V, 82, 1807, p. 41. — Illig. Magaz. III, 1807, p. 103. — Schoenh. Disp. meth. 1826, p. 79; Gen. Curc. I, 1833, p. 385. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 284. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 169. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 42. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 142. — Auriv. Öfv. Vet. Ak. Förh. XLII, 1885, p. 23; Sv. Vet. Ak. Handl. XXI, 15, 1887, p. 3. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 10.

Subgen. *Brachycerus* i. spec. Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 11.
Subgen. *Brachycerinus* Bovie, l. c.
Subgen. *Brachyceromorphus* Bovie, l. c.

accola Kolbe, Arch. Naturg. LXIV, 1898, p. 241. — Brit. Ost-Afrika

acerbus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 671. — Capland

adustus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892, p. 72. — Ovamboland, N'Gami, Namaqua

aegrotus Péring. l. c. IV, 1888, p. 150, t. 4, f. 8. — Süd-Afrika, Transvaal(?)

affaber Gyll. l. c. p. 641. — Capland

albarius Gyll. l. c. p. 633. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 10. — Kaffraria

albicollis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 13, t. 2, f. 1. — Natal

albidentatus Gyll. l. c. p. 654. — Imh. & Labr. l. c. nr. 15. — Bedel, Nouv. et faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 127. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11. — Bovie in Wytsm. Gen. IC, 1909, p. 13, t. 3, f. 11—19. — Corsica, Sicilien, Sardinien

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 125, t. 2, f. 1, 2.

albofasciatus Péring. l. c. IV, 1888, p. 154, t. 4, f. 9. — Namaqua

albotectus Péring. l. c. III, 1885, p. 129, t. 2, f. 5. — Damara

algirus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 120 *(Curculio)*; Entom. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 180, p. 415. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 26. — Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 54, t. 2, f. 19a, b. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 92. — Lamarck, Hist. nat. Anim. sans vert. IV, 1817, p. 358. — Gyllh. l. c. I, 1833, p. 416. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) II, — Süd-Frankreich, Corsica, Spanien, Italien, Sardinien, Sicilien, Malta,

1872, p. 7, 50; Nouv. et faits 1872, p. 119. — Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 153. — Desbr. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 85. — Rey, Echange 1894, p. 63. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11. — Algier, Marokko

Biologie: Jonicus (Champion), Ent. Magaz. III, 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 128.

carinula Rey, l. c.

cirrosus Gyll. l. c. V, 1840, p. 660. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1872, p. 50; Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 154. — Vitale, l. c. p. 12.

exemptus Rey, l. c.

muricatus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 136. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 97, t. 101, f. 8. — Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 253. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 153.

perodiosus Gyll. l. c. V, 1840, p. 661.

planirostris Gyll. l. c. I, 1833, p. 417.

semiaeneus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 365.

sulcifrons Gyll. l. c. I, 1833, p. 420. — (patria falsa: Senegal? Bedel, l. c. p. 154 nota!).

var. *attenuatus* Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 42. — Sicilien

amabilis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 152. — Namaqua

amatongas Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 613. — Mosambik

ambulans Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1870, p. 65. — Kaffraria

anaglypticus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 679. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 14, t. 2, f. 9. — Capland, Kaffraria

var. *nodiferus* Gyll. l. c. — Capland, Kaffraria

var. *sparsipes* Gyll. l. c. — „

annulatus Gerst. Monatsbl. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 305, t. 18, f. 6. — Quedenf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 284. — Mosambik

var. *maculicollis* Péring. Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1888, p. 222. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — Natal

apicatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. Gen. V, 2, 1840, p. 637. — Capland

stellaris Gyll. l. c. I, 1833, p. 424; V, 2, 1840, p. 626, obs.!

var. *cirriferus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 637. — „

apterus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 386. — F. Syst. Ent. 1775, p. 142; Spec. Ins. 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121; Ent. Syst. II, 1792, p. 379; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 54, t. 3, f. 31. — Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 183, t. 223, f. 122. Entom. V, 1807, 82, p. 44, t. 1, f. 3a, b. — Voet, Cat. II, 1806, p. 41, t. 33, f. A. — Lamarck, Hist. Nat. Anim. sans vert. IV, 1817, p. 358. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 386; V, 2, 1840, p. 606. — Imh. & Labr. Gen. Curc. — Kaffraria

Type species – Latreille 1810. 430

II, 1846, nr. 13. — Gerst. in Peters' Reise 1862, p. 305. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 42. — F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 65. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 14, t. 2, f. 7; t. 3, f. 15.

cruciatus Geer *(Curculio)* Mém. Ins. V, 1775, p. 275, t. 16, f. 1.

var. *caffer* Gyll. l. c. I, 1833, p. 394; V, 2, 1840, p. 607. — Capland, Kaffraria, Sierra Leone

var. *ferrugineus* Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 45, t. 3, f. 26. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 389; V, 2, 1840, p. 606. — Capland Madagascar

(var. *tessellatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 388; V, 2, 1840, p. 606. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401.) — Capland = ornatus, Dr.

apterus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 17.

atrox Gerst. in Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, f. 10. — Sansibar

auguris Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 50. — Kaffraria

auritus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 151, t. 4, f. 3. — Capland, Namaqua

axillaris Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 715. — Capland

baccatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 65. — Kaffraria

balearicus Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 171, t. 4, f. 3, 17. — Balearen

barbarus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 386; ed. XII, 1767, I, 2, p. 617 (parte prima descrp.). — F. Syst. Ent. 1775, p. 120; Spec. Ins. 1781, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Ol. Encyl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 1807, 82, p. 49, t. 2, f. 15a, b. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 80. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 661. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 183. — H. Lucas, Bull. Soc. Ent. Fr. 1884, p. 56. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 11. — Spanien, Portugal, Südfrankreich, Algier, Marokko

Biologie: Jonicus (Champion!), Entomol. Magaz. III, 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 128.

algirus Latr. Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 253. — Bedel, l. c. p. 183.

curtulus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.

fluctiger Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 651.

interruptus Rey, Échange 1894, p. 63.

lateralis Gyll. l. c. I, 1833, p. 407; V, 2, 1840, p. 651. — Reiche, l. c.

latro Gyll. l. c. I, 1833, p. 412; V, 2, 1840, p. 656.

libertinus Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 650.

paradoxus Rey, l. c.

var. *ramosus* Schauf. Nunq. Ot. III, 1882, p. 542. — Balearen

batrachus Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 405. — Gallaland

bicallosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 613. — Kaffraria

bicornutus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1874, p. 66. — Caffraria
biglobatus Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 53, t. 3, f. 30. — Capland
— Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 569. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 432; V, 2, 1840, p. 696.
spectrum Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 35.
var. *interpunctatus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 697. — Kaffraria
var. *lentus* Gyll. l. c. p. 696. — Capland
var. *saxosus* Gyll. l. c. p. 697. — „
var. *scrobirostris* Gyll. l. c. p. 697. — Kaffraria
var. *ungulatus* Gyll. l. c. p. 967. — Capland
boschimanus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 160. — „
Bottegi Gestro, Ann. Mus. Genova XXXV, 1895, p. 406. — Gallaland
brachyceropsides Péring. Ann. Mag. Nat. Hist. II, 1888, p. 222. — Natal
brevicostatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 48. — Kaffraria, Sansibar
var. *cinnamomeus* Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 8, t. 1, f. 1; l. c. 1888, p. 25. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
buculus Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427. — Capland
juvencus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 22.
callosus Schoenh. l. c. p. 427. — Fåhrs. in Schoenh., Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 657. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 187; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 200; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92. — Spanien, Portugal, Sicilien, Algier
algirus H. Luc. Hist. Nat. anim. artic. Algér. II, 1849, p. 414.
Chevrolati Fåhrs. l. c. p. 657. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 184, t. 4, f. 9; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 200; Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 92. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 10, f. 3a.
hypocritus Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 190, t. 4, f. 5, 10. — Fauv. Rev. d'Ent. III, 1884, p. 81.
parens Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.
peninsularis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 105, 26.
Raffrayi Desbr. l. c. p. 365.
semituberculatus H. Luc. l. c. p. 411, t. 35, f. 6.
variolosus Thunbg. l. c. p. 30.
canalirostris Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 62. — Kaffraria
cancellatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 404; V, 2, 1840, p. 615. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 46. — Capland
caperans A. Lcht. Cat. Mus. Hambg. 1795, p. 55. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 88. — „
carbunculus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 287. — Central-Afrika
catenulatus Fåhrs. l. c. p. 64. — Kaffraria
caviceps Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 149, t. 4, f. 2. — Capland Namaqua
cavifrons Gyll. l. c. I, 1833, p. 435; V, 2, 1840, p. 717. — Capland
var. *milleporellus* Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 43. — „

milleporus Gyll. (nec Wied.) l. c. I, 1833, p. 435; V, 2, 1840, p. 707, obs.; p. 717.

cincticollis Quedf. l. c. p. 285. — Central-Afrika

cinctipes Gyll. l. c. I, 1833, p. 397. — Capland

cinerarius Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 115. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 426. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 664. — „

var. *spilopterus* Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 117. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 16.

cinereus Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 56, t. 3, f. 35a, b. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 424. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1872, p. 50; Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 156. — Vitale, l. c. p. 11, f. 5a. — Südfrankreich, Italien, Sicilien, Dalmatien, Ungarn, Griechenland, Caucasus, Transcaucasien, Unter-Ägypten

lutosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 417. — Vitale, l. c. p. 12. — Rey, Échange 1894, p. 63.

pulverulentus Ol. l. c. p. 56, t. 3, f. 29.

quadrisulcatus Fisch.-Waldh. Bull. Mosc. II, 1830, ed. Lequien I, p. 95.

superciliosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 422. — Fald. Fn. Transc. II, 1837, p. 168, t. 5.

clitellatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 56. — Kaffraria

collaris Fåhrs. l. c. p. 61. — „

comparabilis Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 243. — West-Usambara

comtus Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 663. — Capland

congestus Gerst. Monatsb. Berl. Ak. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 306, t. 18, f. 7. — Mosambik

consimilis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 133, t. 3, f. 2. — Capland, Namaqua

contortus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 57. — Kaffraria

cordiger Sparrm. Act. Holm. 1785, I, p. 50, t. 3, f. 23. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 568. — F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 161; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 395; V, 2, 1840, p. 613. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 16, t. 2, f. 8. — Capland

papillosus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 20.

scabrosus Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 184; Ent. V, 1807, 82, p. 48, t. 2, f. 11. — Herbst, Käfer VII, 197, p. 93.

corniculatus Gyll. l. c. I, 1833, p. 429; V, 2, 1840, p. 686. — Kaffraria

cornutus L. *(Curculio)* Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 57. — F. Syst. Ent. 1775, p. 153; Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 322; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 51, t. 3, f. 24. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 90. — Thunbg. Nov. Act Ups. VI, 1799, p. 20. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 643. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 11. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 16, t. 2, f. 4; t. 3, f. 14. — Capland, Kaffraria, Damara

rixator Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 11, t. 1, f. 7. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.

spinirostris Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 59, t. 2, f. 9. — Hbst. Käfer VII, 1797, p. 93.

coronirostris Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 627. — Capland

costalis Gyll. l. c. p. 616. — „ SierraLeone

costatus Gyll. l. c. p. 687. — Capland

crenatus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 186; Ent. V, 1807, 82, p. 66, t. 2, f. 17. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 96. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 707. — Madagascar

crispatirostris Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 689. — Capland

crispatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 29. — Herbst, l. c. p. 86. — Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 54, t. 3, f. 27. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 410. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 180. — Algier, Tunis

clathratus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 362.

pterygomalis H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 411.

rectecostatus Desbr. l. c.

crispicularis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 690. — Capland

cristatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 134, t. 2, f. 7. — Kaffraria, Namaqua

curruca Gyll. l. c. p. 677. — Capland

cylindripes Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 171, t. 4, f. 4. — Marokko

deceptor Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 163. — Capland

densegranosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 320, t. 3, f. 8. — Ost-Afrika

detritus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 21. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 403. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 612. — Capland

var. *hottentottus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 393. — Fåhrs. l. c. p. 612. — „

var. *koroquanus* Fåhrs. l. c. p. 612. — „

var. *maculosus* Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 429. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 669. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — „

maculatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 395. — Fåhrs. l. c. p. 611.

difficilis Péring. Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 421. — Windhuk

discolor Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 647. — Capland

disjunctus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 10, t. 1, f. 4. — Damara

dispar Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 158. — Namaqua

dorsalis Gyll. l. c. I, 1833, p. 425; V, 2, 1840, p. 677. — Capland

dorsomaculatus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 193. — Central-Afrika

dubius Panz. Voets Beschr. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. E. — Patria?

minor Voet, Cat. II, 1806, p. 46, & Index p. 16, t. 34, f. E.

duplicatus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 638. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 51.	Kaffraria
var. *Boei* Gyll. l. c. p. 638.	„
ebullinus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 157.	Capland
echinatus Gyll. l. c. I, 1833, p. 402; V, 2, 1840, p. 645.	„
Eckloni Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 694.	Kaffraria
♂*longiusculus* Gyll. l. c. p. 695. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.	
suturalis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 9, t. 1, f. 2, 1888, p. 25.	
effertus Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 188.	Zambesi
emeritus L. Mus. Ludov. Ulr. 1764, p. 56. — F. Syst. Ent. 1775, p. 152; Spec. Ins. I, 1781, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 480; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 535. — Ol. Encycl. meth. V, 1790, p. 546. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 59. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 403. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 617.	Capland
ephippiatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 56.	Kaffraria
erinaceus Ol. Ent. V, 1807. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 400; V, 2, 1840, p. 644.	Capland
erosus Gerst. Monatsb. Berl. Akad. 1855, p. 83; Peters' Reise 1862, p. 306.	Mosambik
errans Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 66.	Kaffraria
eximius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 9, t. 1, f. 3.	Capland
facietatus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 618.	„
Fahraei Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 718.	„
farctus Ill. in Schneider, Neues Ent. Magaz. V, 1794, p. 617. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 98. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 393; V, 2, 1840, p. 611.	„
fascicularis Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 64, t. 3, f. 31. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 438. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 645.	„
fascicularis Panz. (gen. dub.!) Voets Beschr. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. c.	„
capensis Voet, Cat. II, 1806, p. 45, Index p. 16, t. 34, f. C.	
fasciculosus Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 425. — Fåhrs. in Schoenh. l. c. V, 2, 1840, p. 634.	„
ferox Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 320.	Deutsch-Ostafrika
ferrugatus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 286.	Central-Afrika
Fischeri Kolbe, Arch. f. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 244.	Ost-Usambara
flavonotatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 147, t. 4, f. 8.	Capland
formidulosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 699.	„
foveifrons Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 194, t. 4, f. 6, 15.	Syrien
foveolatus Péring. l. c. IV, 1888, p. 160.	Capland
fuliginosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 712.	„
gemmatus Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 82, p. 62, t. 2, f. 13. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 438.	Patria?

gemmeus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 704. — Capland
gemmifer Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 394. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 680. — „
glabratus Wiedem. in Germar, Magaz. IV, 1821, p. 157. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 437; V, 2, 1840, p. 719. — „
glanduliferus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 667. — „
globiferus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 21. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 403; V, 2, 1840, p. 621. — „
var. *bullatus* Gyll. l. c. I, 1833, p. 396; V, 2, 1840, p. 621. — „
globosus Drury, Illustr. Nat. Hist. I, 1770, p. 69, t. 32, f. 4; II, 1773, Index. — F. Syst. Ent. 1775, p. 153; Spec. Ins. 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 54. — Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 184; Ent. V, 1807, 82, p. 47, t. 2, f. 10a, b. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 85, t. 101, f. 7. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 18. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 392. — Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 610. — „
granicollis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 710. — „
granifer Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 43. — Kaffraria
granirostris Fåhrs. l. c. p. 62. — „
granosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 387. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 607; Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, p. 43. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401. — F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 65. — „ = ornatus, Dr.
apterus Herbst, Käfer VII, 1797, p. 75, t. 101, f. 1.
(?) *ornatus* Drury, Illustr. Nat. Hist. II, 1773, p. 63, t. 34, f. 3.
granulatus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 284, nota 2. — Senegal
gravis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 46. — Kaffraria
griseus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 433; V, 2, 1840, p. 714. — Capland
gryphus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 16, t. 2, f. 7 (nec 6). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — Usambara = atrox
guineensis Péring. Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 407. — Marshall, l. c. — Guinea
Gyllenhali Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 614. — Capland
haedus Gyll. l. c. I, 1833, p. 401; V, 2, 1840, p. 644. — „
hilaris Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 420. — Namaqua
Hofmanni Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 72. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 19, t. 2, f. 10. — Mbungu, Brit. Ostafrika
honorabilis Brancs. Jahresh. Naturw. Ver. Trencsen. Komit. XIX, 1897, p. 122, t. 4, f. 14. — Zambesi
humeralis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 151. — Namaqua
hybridus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 58. — Kaffraria
hypocrita Fåhrs. l. c. p. 59. — „
hystrix Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 399; V, 2, 1840, p. 644. — Marshall, Proc. Zool. Soc. Lond. 1906, p. 957. — Capland

cornutus Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 53, t. 2, f. 14. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 286 nota 1.
frontalis Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 619. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.

ignavus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 44. — Kaffraria
impendens Fåhrs. l. c. p. 47. — „
impius Fåhrs. l. c. p. 46.
impressicollis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 130, t. 2, f. 1, 1a. — Transvaal, Capland
draco Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 15, t. 2, f. 4. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
impressifrons Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 631. — Kaffraria
imprudens Gyll. l. c. p. 670. — Capland
inaequalis Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 27. — Gyll. l. c. p. 648. — „
Thunbergi Gyll. l. c.
incommodus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892, p. 72. — Owamboland
indutus Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 187. — Capland
infitialis Péring. Denksch. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 420. — Hereroland
ingratus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 50. — Kaffraria
inops Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 161. — Capland
inordinatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 54. — Kaffraria
intermedius Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 127. — Transvaal
interpositus F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 66. — „
interstitialis Fåhrs. l. c. p. 59. — Kaffraria
intutus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 658. — Capland
inurbanus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 626. — „
junix A. Lcht. Cat. Mus. zool. Hamb. III, 1796, p. 55. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 88. — Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 236. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 657. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 195. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 421. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12, f. 7a. — Rey, Échange 1894, p. 63. — Sicilien, Jonische Inseln, Griechenland, Türkei, Chios, Kleinasien, Syrien, Mesopotamien, Süd-Rußland, Kaukasus, Unter-Ägypten, Tripolis
pisifer Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 23. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 427; V, 2, 1840, p. 656.

var. *aegyptiacus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 51, t. 3, f. 34. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 410. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 421. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 5, 12. — Rey, Échange 1894, p. 63. — Ägypten, Kleinasien, Syrien, Griechenland, Sicilien
argillaceus Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 654.

insularis Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 367.	
nodulosus Reiche, l. c. p. 658.	
Olivieri Desbr. l. c. p. 367.	
ornatus Reiche, l. c. p. 658.	
siculus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414.	
tauricus Desbr. l. c. p. 368. — Kraatz, l. c. p. 422.	
var. *cribrarius* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 58, t. 3, f. 33. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 403.	Mesopotamien,
fimbriatus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 365.	Syrien, Tripolis
var. *orbipennis* Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 656.	Syrien
var. *sinuatus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 58, t. 3, f. 26. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414. — Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 264. — Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 233.	Dalmatien, Ungarn, Südrußland,
Besseri Kryn. Bull. Mosc. V, 1832, p. 145; ed. Lequien, p. 181. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 413; V, 2, 1840, p. 656. — Fald. Faun. Transcauc. II, 1837, p. 165, t. 5. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 15.	Türkei, Griechenland, Chios, Kleinasien,
difformis Fald. Nouv. Mém. Mosc. VI, 1837, p. 16.	Persien
incertus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 367.	
lutulentus Gyll. l. c. I, 1833, p. 418; V, 2, 1840, p. 657. — Rey, Échange 1894, p. 63.	
juvencus Sparrm. Act. Holm. 1795, p. 51, t. 3, f. 26. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 424.	Capland
ixodicoides Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 162.	„
kabylianus Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 364. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 169.	Algier, Tunis
velutinus Desbr. l. c. p. 364. — Bedel, l. c. p. 169.	
karooensis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 153.	Capland
khoikhoianus Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 315.	Namaqua
kumbanensis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 192, 284. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 402. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 20, t. 2, f. 2.	Quango, Kumbana, (Central-Afrika)
labruska Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 672.	Capland
uva Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 23. (nec ... 1785)	
Lacordairei Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401.	Congo
laevifrons Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 58.	Kaffraria
Lafertei Péring. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 78.	Madagascar
lateritius Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 685.	Capland
latifrons Gyll. l. c. p. 642.	„
levidipus Gyll. l. c. p. 700.	„
lividicollis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 57.	Kaffraria
lobaticollis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 131, t. 2, f. 2.	Damara
longirostris Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 692.	Capland
longulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 34.	Choa

loquax F. Hartm.) Deutsche Ent. Zeitschr, 1906, p. 66.	Transvaal
luridus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 44.	Kaffraria
luteus Wiedm. Zool. Mag. II, 1823, p. 114. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720.	Capland
maculatus Ol. Enc. meth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 45, t. 2, f. 8. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 92. — Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 613.	Madagaskar
madagascariensis Schoenh. l. c. p. 613.	
maculipes Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 34.	Abessinien
margaritifer Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 697. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 59.	Kaffraria, Capland
biglobatus var. η Gyll. l. c. (olim).	
milleporus Wiedm. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 162. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 706. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 21, t. 2, f. 6.	Kaffraria, Capland
gemmosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 436; V, 2, 1840, p. 706, 707 obs.	
modestus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 52.	Kaffraria
moerens Pasc. Trans. Soc. Ent. Lond. 1887, p. 17, t. 2, f. 6 (nec 8 !). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.	Zambesi
divergens Péring. Trans. Ent. Soc. Lond. 1896, p. 187. — Marshall, l. c. p. 481.	
moestus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 156.	Namaqua
monachus Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 60.	Kaffraria
morio F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 416. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 438. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 711.	Capland
Mouffleti Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 317.	N.-Ovamboland, Benguela
muricatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 415. — Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 19, t. 13, f. 21. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 419; V, 2, 1840, p. 662. — Redt. Fn. Austr. ed. II, 1858, p. 696; ed. III, 1873, II, p. 240. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 192.	Oesterreich, Ungarn, Sicilien, Türkei, Kleinasien
foveicollis Gyll. l. c. I, p. 419. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 191, t. 4, f. 11. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12, f. 8a.	
ventralis Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 366.	
var. *pygmaeus* Vitale, l. c. p. 12.	Sicilien
namanus Péring. Ann. S. Afric. Mus. V, 1908, p. 316; Denkschr. med.-natw. Gesellsch. Jena XIII, 1908, p. 419.	Capland Namaqua
namaqua Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 148, t. 4, f. 6.	„
natalensis Fåhrs. l. c. XXVIII, 1871, p. 48.	Kaffraria
nebulosus Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 60, t. 3, f. 20. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 405; V, 2, 1840, p. 646.	Capland

nodifrons Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 52. — Kaffraria
nodulosus Fåhrs. l. c. p. 49. — „
Normandi Desbr. Frelon VII, 1899, p. 11. — Tunis
nudus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 135, t. 3, f. 3. — Namaqua, Capland
obesus F. *(Curculio)* Syst. Ent. Append. 1775, p. 822; Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120. — Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 54, t. 3, f. 32. — Herbst in Fuessly, Arch. 1786, p. 167 t. 45, f. 8. — L. Syst. Nat. ed. XIII *(Gmelin)* I, 4, 1788, p. 1788. — F. *(Brachycerus)* Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 78, t. 101. f. 2. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 18. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 391. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 608. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 13. — „
afer Wulfen, Descript. Capens. Insect. 1786, p. 15 t. 1, f. 11a, b.
oedematosus Sulz. Abgek. Gesch. Ins. 1776, p. 40 t. 4, f. 10.
scalaris Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183; Ent. V, 1807, 82, p. 46, t. 2, f. 18.
var. *tuberculatus* Geer, Mém. Ins. VII, 1778, p. 658. t. 49, f. 8. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 391 (var. β). — „
obesus Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 184; Ent. V, 1807, 82, p. 46, t. 1, f. 1a, b.
var. *punctulatus* Ol. Ent. V, 1807, 82, p. 48, t. 3, f. 37. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 391 (var. δ). — „
oblongus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 49. — Kaffraria
Fausti Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 12, t. 1, f. 8; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25. — Natal
praecursor Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 12, t. 1, f. 9; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25. — Capland
obtusus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 14, t. 2, f. 3. — Natal
ocellatus F. *(Curculio)* Syst. Ent. 1775, p. 154; Spec. Ins. I, 1781, p. 196; Mant. Ins. I, 1787, p. 121. — L. Syst. Nat. ed. XIII *(Gmelin)* I, 4, 1788, p. 1792. — F. *(Brachycerus)* Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 183. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 89. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 19. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 390; V, 2, 1840, p. 608. — Alluaud in Grandidier, Hist. Nat. Madag. 1900, p. 406. — Madagascar
madecassus Péring. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXXII, 1888, p. 77. — Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 38. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
ochreosignatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871 p. 43. — Kaffraria
oxonchus Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 118. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720. — Capland
papulosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 705. — „
parcus Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 243. — Tanganyika-See
peregrinus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 63. — Kaffraria

perplexus Fåhrs. l. c. p. 51. — Kaffraria
Perrieri Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 38. — Madagascar
pertusus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 36. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 713. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 12. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 22, t. 2, f. 5. — Capland
var. *pseudocancellatus* Pape, nom. nov. *cancellatus* Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 713. — „
petulcus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 429; V, 2, 1840, p. 686. — Kaffraria Orange-Fluß
phlyctaenoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 13, t. 1, f. 10. — Guinea
phrygianus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 698. — Capland
phrynopterus Fairm. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 53. — Kolbe in Werther, Irangi-Expedition 1898, p. 309. — Sansibar, Massai-steppe
picturatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 45. — Kaffraria
pictus Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 426; V, 2, 1840, p. 668. — Capland = venustus, Iod.
piger Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 640. — Kaffraria = vestitus G. H.
plicatus Gyll. l. c. I, 1833, p. 415; V, 2, 1840, p. 659. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 164, t. 4, f. 8, 13, 16. — Spanien, Balearen, Griechenland, Kleinasien, Algier
europaeus Gyll. l. c. I, 1833, p. 421.
insignis Mill. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 206. — Mars. Abeille IV, 1867, p. XV.
opacus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 334.
scutipennis Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 363.
superciliosus Gyll. (var. β) l. c. V, 2, 1840, p. 662. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 16.
tetanicus H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 414.
vespertilio Desbr. l. c. p. 363.
polymastulus Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 242. — Sansibar
polyophthalmus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 693. — Guér. Icon. Règne Anim. Ins. 1829/38, p. 140.
oculatus Guér. l. c. p. 140, t. 37, f. 1. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 694. — Capland
posticus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 643. — Kaffraria
Pradieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 536. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 119; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 161.
Biologie: Mars. Nouv. et Faits 1875, p. 96. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 96. — Baron, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) 1875, p. 155, 162.
europaeus Pradal, Hist. Col. Loire-Inf. 1859, p. 140. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 162. — West-Frankreich, Spanien
proletarius Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 158. — Namaqua
pseudoscutellatus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 63. — Kaffraria

puerilis Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 240. — Brit. Ost-Afrika

pulvereus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 629. — Capland

pumilus Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — „

nanus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 161.

pustulosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 390; V, 2, 1840, p. 608. — „

racemus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 673. — „

uva Gyll. l. c. I, 1833, p. 402; V, 2, 1840, p. 673.

Raffrayi Chevr. Compt. rend. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 89. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 35. — Abessinien

reflexus Gyll. l. c. V. 2, 1840, p. 620. — Kaffraria

Reinhardti Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 675. — Guinea

reticulatus Wiedem. Zool. Mag. II, 1823, p. 113. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 424; V, 2, 1840, p. 683. — Capland

reticulosus Gyll. l. c. I, 1833, p. 434; V, 2, 1840, p. 714. — „

riguus Er. in Wagners Reise III, 1841, p. 185, t. 8. — Küster, Käf. Eur. II, 1845, fol. 38. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 149. — Rey, Échange 1894, p. 63. — Algier

rotundatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III 1885 p. 136, t. 2, f. 6. — Damara, Zambesi

rubiginosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 624. — Capland

rudis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 625. — „

rugipes Gyll. l. c. p. 629. — „

rugosus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 27. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 649. — „

rugulosus Gyll. l. c. p. ~~649~~ 650. — Kaffraria

rusticanus Gyll. l. c. p. 669. — Capland

sacer Latr. in Cailliaud, Voyage à Méroé IV, 1827, p. 291. — Bertolini, Nov. Comm. Ac. Bonon. X, 1849, p. 401. — Imh. & Labr. Gen. Curc. II, 1846, nr. 14. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 401. — Sennaar

bufo Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VIII, 2, 1845, p. 375. — Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2334.

var. *pustulatus* Faust, l. c. p. 401. — Congo

saginatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 709. — Kaffraria

salamensis Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 243. — Sansibar

scabiosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, v. 674. — Capland

scalaris F. *(Curculio)* Gen. Ins. Mant. 1777, p. 228; Spec. Ins. I, 1781, p. 195; Mant. Ins. I, 1787, p. 120. — L. Syst. Nat. ed. XIII *(Gmelin)* I, 4, 1788, p. 1789. — F. *(Brachycerus)* Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 380; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 412. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 87. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 19. — Schoenh. Gen. Curc. ~~I, 1833, p. 392; V, 2, 1840, p. 610.~~ — „

scelestus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 715. — Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 66. — „ Kaffraria

Schalowi Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 285. — Tanganyika

scrobicollis Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 622. — Kaffraria

scrobiculatus Gyll. l. c. I, 1833, p. 404; V, 2, 1840, p. 615. Capland
scrobipennis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 53. Kaffraria
scrupulosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 701. Capland
var. *suspiciosus* Gyll. l. c. p. 701. „
sculpturatus Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 678. „
electilis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 14, t. 2, f. 2; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25. Algoa Bay
scutellaris H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 413, t. 35, f. 9. — Bedel, Nouv. et. Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 159, t. 4, f. 14. Algier
cirrosus H. Luc. l. c. p. 413, t. 35, f. 8 a, d.
scutirostris Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 437. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 637. Patria?
semiocellatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 397; V, 2, 1840, p. 623. Senegal
seriedentatus Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 39. Madagascar
setiger Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 633. Kaffraria
setipennis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 60. „
setosus Wiedem. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 160. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 431; V, 2, 1840, p. 688. Capland
severus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 47. Kaffraria
signatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 159. Capland
socors Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 51. Kaffraria
Sparrmani Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 716. Capland
spinicollis Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 205, t. 4, f. 7, 12. Syrien
spiniger F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 413. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 439. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 691. Guinea
spinipes Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 133, t. 3, f. 4. Namaqua, Capland
spissus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 708. Kaffraria
squalidus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 64. „
squamosus Péring. l. c. III, 1885, p. 128, t. 2, f. 4. Damara
stellaris Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 63, t. 3, f. 36. — Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 635. Capland
capito Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 10, t. 1, f. 5; Proc. Ent. Soc. Lond. 1888, p. 25.
sticticus Voet in Panzer, Voets Beschr. hartsch. Ins. IV, 1798, p. 42, t. 34, f. D. „
americanus Voet, Catal. II, 1806, p. 45; Index p. 16, t. 34, f. D.
scoposus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 400; V, 2, 1840, p. 644.
serratus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 25.
strumosus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 16, t. 2, f. 8 (nec 7!). — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 24, t. 2, f. 3. ~~Senegal~~ E. Africa
Schoenherri Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 149, t. 4, f. 5. — Marshall, l. c.

subfasciatus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 640. — Capland
var. *bardus* Gyll. l. c. — „
sulcaticeps Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 44. — Sansibar
sulcicollis F. Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 67. — Transvaal
suturalis Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 156, t. 4, f. 1. — „
Papei Zaitzev, Rev. Russe d'Ent. 1907, p. 137.
tauriculus Sparrm. *(Curculio)* Act. Holm. 1785, p. 51, t. 3, f. 25. — Ol. Enc. méth. Ins. V, 1790, p. 569. — Capland
inaequalis Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Ent. V, 1807, 28, p, 61, t. 2, f. 12. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 382; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 89. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 428.
tenebrosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 630. — Kaffraria
tergosignatus Gyll. l. c. p. 702. — Capland
texatus Gyll. l. c. I, 1833, p. 433; V, 2, 1840, p. 711. — „
torvus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 691. — „
transversefoveatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 154. — Namaqua
transversus Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 57, t. 3, f. 23. Gyll. l. c. I, 1833, p. 415; V, 2, 1840, p. 615. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 148. — Algier
barbarus Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 253.
tremens Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 686. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, t. 2, f. 1. — Kaffraria
tuberosus Wiedem. in Germ. Magaz. IV, 1821, p. 160. — Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 666. — Capland
var. *contextus* Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 423. — Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 665. — „
var. *gemmatus* Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 22. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 419 (ex err.). — Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 665. — „
var. *instabilis* Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 665. — „
var. *margaritaceus* Germ. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 398. — Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 665. — „
var. *subverrucosus* Fåhrs. l. c. V, 2, 1840, p. 666. — „
turbatus Pasc. Trans. Ent. Soc. 1887, p. 15, t. 2, f. 5. — Natal
turgidus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 609. — Capland
turriferus Gyll. l. c. p. 623. — „
tursio Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XII, 1873, p. 6, t. 1, f. 10. — Damara
var. *insignis* Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 127, t. 2, f. 3. — „
ulcerosus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 668. — Capland
umbrinus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 55. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 25, t. 2, f. 11. — Kaffraria
undatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 162; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 414. — Ill. Magaz. VI, 1807, p. 305. — Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 50, t. 2, f. 16a, b. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 408; V, 2, 1840, p. 653. — Imh. & Labr. II, 1846, nr. 16. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 4, f. 20. — Bedel, Nouv. et Faits 1872, p. 118; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 173. — Algier, Spanien, Balearen, Südfrankreich, Italien, Sicilien, Sardinien,

— Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 146 (patr. Afr. centr.!). — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 10, f. 1a. — Rey, Échange 1894, p. 63. Illyrien, Istrien, Griechenland

Biologie: Jonicus (Pseudon. Champion), Entom. Magaz. III, 1836, p. 465. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, p. 128. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) IV, 1874, v. 177. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) V, 1875, p. 95, 96.

algirus Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 91, t. 101, f. 3.

barbarus L. Syst. *(Curculio)* Nat. ed. XII, 1767, I, 2, p. 617 (parte sec. descr.). — F. Syst. Ent. 1775, p. 152; Spec. Ins. II, 1791, p. 194; Mant. Ins. I, 1787, p. 120; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 381. — De Villers, Car. Linn. Ent. I, 1789, p. 211. — Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 122. — Petagna, Specim. Insect. Calabr. 1787, p. 13; Instit. Ent. 1792, t. 2, f. 3. — Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 24. — Dum. Cons. gén. Ins. 1823, t. 16, f. 4. — H. Luc. Hist. Nat. Algér. II, 1849, p. 412.

capensis Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 427; V, 2, 1840, p. 652.

cornifrons Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 363.

corrosus Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 409; V, 2, 1840, p. 654.

crispatus Latr. Gen. Crust. Ins. II, 1807, p. 253.

crispatus Rey, Échange 1894, p. 63.

europaeus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 25.

hispidus Desbr. l. c. p. 361.

incultus Gyll. l. c. I, 1833, p. 411; V, 2, 1840, p. 653.

lacunatus Latr. l. c. p. 252 nota.

mauritanicus Ol. Entom. V, 1807, p. 51, t. 3, f. 22. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 414; V, 2, 1840, p. 653. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 661 nota. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXII, 1902, p. 12.

nubilus Desbr. l. c. p. 361.

ovatus Brullé, Expéd. Morée III, 1832, p. 235, t. 42, f. 1.

pterygomalis Gyll. l. c. I, 1833, p. 406; V, 2, 1840, p. 652.

quadratus Voet, Cat. Col. II, 1806, p. 45, t. 33, f. B.

sericeus Desbr. l. c. p. 361.

serratus Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 52, t. 3, f. 30.

subvariolatus Desbr. l. c. p. 360.

var. *lyrae* Vitale, Riv. Coleott. Ital. III, 1905, p. 206. Sicilien

uva Sparrm. Act. Holm. 1785, p. 53, t. 3, f. 29. — Ol. Encycl. meth. Ins. V, 1790, p. 596. — L. Syst. Nat. XIII, I, 4, 1788, p. 1794. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 383; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 416. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 86. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 673. Capland

uvula Kolbe, Arch. f. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 242. Ost-Afrika

vacca Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 17. Capland

asper Ol. Entom. V, 1807, 82, p. 64, t. 3, f. 32. — Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 428. V, 2, 1840, p. 684.

vagabundus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 54. — Kaffraria

variegatus Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 106. — „
sticticus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 67.

variipictus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 284, t. 6, f. 7. — Quango

variolosus Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 185; Entom. V, 1807, 82, p. 61, t. 1, f. 7. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 95, t. 101, f. 10. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 438; ~~V, 2, 1840, p. 707.~~ — Capland

varius Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. IV, 1888, p. 155. — Südafrika

venustus Wiedem. Zool. Magaz. II, 1823, p. 116. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 440; V, 2, 1840, p. 720. — Capland

verrucifer Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. 1818, p. 430. — Schoenh. l. c. I, 1833, p. 431; V, 2, 1840, p. 683. — „

verrucipennis Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 430; ~~V, 2, 1840, p. 693.~~ — Südafrika

verrucosiusculus Pape, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 106.
subverrucosus Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 53. — Kaffraria

verrucosus Ol. Encycl. méth. Ins. V, 1790, p. 184, t. 224, f. 3; Entom. V, 1807, 82, p. 49, t. 1, f. 2. — Herbst, Käfer VII, 1797, p. 94, t. 101, f. 9. — Gyll. l. c. I, 1833, p. 396; V, 2, 1840, p. 620.
speciosus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. III, 1885, p. 131, t. 3, f. 1. — Marshall, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 481.
taeniatus Thunbg. Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 28.
var. *nanus* Péring. l. c. p. 132. — Marshall, l. c. — Capland, Namaqua

vestitus Gyll. l. c. V, 2, 1840, p. 628. — Kaffraria

viduatus Péring. Trans. S. Afric. Phil. Soc. VI, 1892, p. 73. — Südwest-Afrika

Wahlbergi Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 45. — Péring. l. c. VI, 1892, p. 74. — Kaffraria

Westermanni Fåhrs. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 607. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 27, t. 2, f. 12. — Capland

Zeyheri Gyll. in Schoenh. Gen. Curc. V, 2, 1840, p. 682. — Kaffraria

298

III. Subfam. Brotheinae.

Marshall, Trans. South Afric. Philos. Soc. XVIII, 1907, p. 89.

Brotheini Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 29.

Synthocus Schoenh.

Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 89. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 29.

Daulaxius Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 333.

acuticollis Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 96, t. 6, f. 8. — Namaqua

adustus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 464. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 102. — Betschuanaland, Damaraland

sordidus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 140. — Damaraland

damarensis Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 96. — Damaraland

dorsalis Fåhrs. Öfv. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 198. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 95. — Mashonaland, Matabeleland

flavotuberosus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 101, t. 6, f. 10. — Damaraland

frater Marshall, l. c. p. 99, t. 6, f. 9. — Namaqua

Hopei Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 412. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 92. — Capland, Namaqua

paradoxus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 137, t. 3, f. 5.

mashunus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 104. — Mashonaland Matabeleland

nigropictus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 463, t. 19, f. 11. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 102. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 30, t. 1, f. 11, t. 3, f. 19.

sagittarius Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 139.

ovampoensis Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 98, t. 6, f. 7. — Ovamboland

parvus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 164. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 99. — Capland, Transvaal, Ovamboland

plagosus Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 138. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 103. — Capland

quadripennis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 165. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 97. — Namaqua

Reichei Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 411. — Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 100.

sinuatus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 94. — Betschuanaland, Mashonaland, Sudan

stolatus Pasc. *(Daulaxius)* Trans. Ent. Soc. 1887, u. 333, t. 11, f. 11. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 105. — Delagoa-Bay

truncatus Boh. in Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 410. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. ~~105~~ 93. — Capland, Senegal

informis Chevr. *(Rhytirrhinus)* in Guér. Icon. Règne Anim. 1844, p. 143, t. 37, f. 8.

Wardeni Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 165, t. 3, f. 13. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 105. — Namaqua

var. *bicuspis* Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 106. — „

Brotheus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 152. — Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 421. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 106. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 31.

Ixodicus Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448.

binodosus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 108, t. 6, f. 11. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 31, t. 1, f. 12. — Capland

carinatus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 110, t. 6, f. 14. — „

crenelatus Marshall, l. c. XVIII, 1907, p. 112, t. 6, f. 12. — „

flexuosus Marshall, l. c. p, 115, t. 6, f. 15. — Bovie, l. c. t. 1, f. 13. — „

laevigatus Marshall, l. c. v. 109. — „

occlusus Pasc. *(Ixodicus)* Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448, t. 13, f. 8. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 114. — „

planus Thunbg. *(Brachycerus)* Nov. Act. Ups. VI, 1799, p. 35. — Schoenh. *(Byrsops)* Gen. Curc. II, 1834, p. 413. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 112. — „

praecisicollis Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 109. — Süd-Afrika

praemorsus Thunbg. *(Brachycerus)* Nov. Act. Ups. VI, 1899, p. 33. — Schoenh. Gen. Curc. I, 1833, p. 439. — Schoenh. *(Byrsops)* Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 115. — Capland

deprimatus Boh. *(Byrsops)* Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 407.

porcatus Marsham *(Curculio)* Ent. Brit. 1802, p. 255. — Steph. *(Brotheus)* Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 154. — Schoenh. Gen. Curc. VI, 2, 1842, p. 421; VIII, 2, 1845, p. 315.

pumilus Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 116, t. 6, f. 13. — „

pusio Wiedem. *(Brachycerus)* Zool. Magaz. II, 1, 1823, p. 113. — Schoenh. *(Byrsops)* Gen. Curc. 1834, p. 413; VI, 2, 1842, p. 408. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 111. — „

sordidus Pasc. *(Ixodicus)* Journ. Linn. Soc. Lond. XI, 1872, p. 448. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 113. — „

12

Euryxena Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 337. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 117. — Bovie in Wytsm. Gen. Ins. IC, 1909, p. 32.

bruchoides Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. 1887, p. 338, t. 11, f. 1. — Marshall, Trans. S. Afr. Phil. Soc. XVIII, 1907, p. 118. — Capland

1

415

Index.

Subfamiliae, Tribus, Genera, Subgenera.

Brachycerinae Auriv. 9
Brachycerini Pape 10
Brachycerinus Bovie 11
Brachyceromorphus Bovie 11
Brachycerus Ol. 11
Brachycerus i. sp. Bovie 11
Brotheinae Marshall 28
Brotheus Steph. 30

Daulaxius Pasc. 28
Dyerocera Pasc. 10

Episus Schoenh. 3
Euretus Péring. 11
Euryxena Pasc. 30

Gyllenhalia Auriv. 9

Ixodicus Pasc. 30

Lagenisus Jek. 3

Microcerinae Auriv. 3
Microcerus Schoenh. 6

Protomantini Pape 9
Protomantis Schoenh. 9

Synthocus Schoenh. 28

Theates Fåhrs. 10

Species, Varietates.

abyssinicus Fairm. 6
accola Kolbe 11
acerbus Gyll. 11
aculeatus Imh. 3
acuticollis Marshall 29
adustus Péring. (Brach.) 11
adustus Pasc. (Synth.) 29
aegrotus Péring. 11
aegyptiacus Ol. 19
afer Wulfen 22
affaber Gyll. 11
albarius Gyll. 11
albicollis Pasc. 11
albidentatus Gyll. 11
albiventer Gerst. 7
albofasciatus Péring. 11
albotectus Péring. 11
albulus Lacord. 6
algirus F. 11
algirus Latr. 13
algirus H. Luc. 14
algirus Ol. 27
amabilis Péring. 12
amatongas Péring. 12
ambulans Fåhrs. 12
americanus Voet 25
anaglypticus Gyll. 12
angulicollis Auriv. 3
angusticollis Fåhrs. (Episus) 4
angusticollis Wiedem. (Theates) 10
annulatus Gerst. 12
annuliger Har. 7
apicatus Gyll. 12
apterus L. 12
apterus Thunbg. 13
apterus Hbst. 18
argillaceus Reiche 19
asper Ol. 27
attenuatus Vitale 12
atrox Gerst. 13
auguris Fåhrs. 13
auritus Péring. 13
Aurivillii Péring. 11
axillaris Gyll. 13

baccatus Fåhrs. 13
balearicus Bedel 13
barbarus L. 13
barbarus Latr. 26
barbarus L. 27
bardus Gyll. 26

batrachus Gestro 13
Besckei Fåhrs. 7
Besseri Kryn. 20
bicallosus Gyll. 13
bicornutus Fåhrs. 14
bicuspis Marshall 29
biglobatus Sparrm. 14
biglobatus Gyll. 21
bimaculatus Thunbg. 8
binodosus Marshall 30
Boei Gyll. 17
Bohemani Auriv. 4
Borrei Auriv. 7
boschimanus Péring. 14
Bottegi Gestro 14
brachyceropsides Péring. 14
brevicollis Jek. 4
brevicostatus Fåhrs. 14
bruchoides Pasc. 30
buculus Schoenh. 14
bufo Boh. 24
bullatus Gyll. 18

caffer Gyll. 13
callosus Schoenh. 14
canalirostris Fåhrs. 14
cancellatus Gyll. 14
cancellatus Gyll. 23
capensis Voet 17
capensis Schoenh. 27
caperans A. Lcht. 14
capito Pasc. 25
carbunculus Quedf. 14
carinatus Marshall 30
carinula Rey 12
catenulatus Fåhrs. 14
caviceps Péring. 14
cavifrons Gyll. 14
cavirostris Fairm. 7
Chevrolati Fåhrs. 14
cincticollis Quedf. 15
cinctipes Gyll. 15
cinerarius Wiedem. 15
cinereus Ol. 15
cinnamomeus Pasc. 14
cirriferus Gyll. 12
cirrosus Gyll. 12
cirrosus H. Luc. 25
clathratus Desbr. 16
clitellatus Fåhrs. 15.
coenosus Jek. 4
cognatus Fåhrs. 4
collaris Fåhrs. 15
comparabilis Kolbe 15
comtus Fåhrs. 15
congestus Gerst. 15
consimilis Péring. 15
contextus Gyll. 26
contortus Fåhrs. 15
contractus Fåhrs. 4
cordiger Sparrm. 15
corniculatus Gyll. 15
cornifrons Desbr. 27
cornutus L. 15
cornutus Ol. 19
coronirostris Gyll. 16
corrosus Gyll 27
costalis Fåhrs. (Micr.) 7
costalis Gyll. (Brach.) 16
costatus Gyll. 16
crenatus Ol. 16
crenelatus Marshall 30
cretaceus Gyll. 7
cribellatus Fairm. 7
cribrarius Ol. 20
crispatirostris Gyll. 16
crispatus F. 16
crispatus Latr. 27
crispatus Rey 27
crispicularis Gyll. 16
cristatus Péring. (Brach.) 16
cristatus Gyll. (Episus) 5
cristatus Péring. (Theates) 10
cruciatus Geer 13
curruca Gyll. 16
curtulus Desbr. 13
cyathiformis Gyll. 4
cylindripes Bedel 16

damarensis Marshall 29
deceptor Péring. 16
densegranosus Fairm. 16
dentatus Boh. 5
depressus Auriv. 7.
deprimatus Boh. 30
detritus Thunbg. 16
Devylderi Auriv. 4
difficilis Péring. 16
difformis Fald. 20
discolor Gyll. 16
disjunctus Pasc. 16
dispar Péring. 16
divergens Péring. 21
Dohrni Auriv. 4
dorsalis Fåhrs. (Synth.) 29
dorsalis Fåhrs. (Episus) 4
dorsalis Gyll. (Brach.) 16
dorsofumatus Fairm. 7
dorsomaculatus Quedf. 16
draco Pasc. 19
Dregei Gyll. (Micr.) 7
Dregei Gyll. (Protom.) 9
Dregei Boh. (Episus) 4
Dregei Lacord. (Micr.) 8
dubius Panz. (Brach.) 16
dubius Auriv. (Episus) 5
duplicatus Gyll. 17

ebullinus Péring. 17
echinatus Boh. (Episus) 4
echinatus Gyll. (Brach.) 17
Eckloni Gyll. 17
effertus Péring. 17
electilis Pasc. 25
elegans Auriv. 10
elongatus Auriv. 4
emeritus L. 17
ephippiatus Fåhrs. (Brach.) 17
ephippiatus Sparrm. (Micr.) 8
erinaceus Ol. 17
erosus Gerst. 17
errans Fåhrs. 17
europaeus Gyll. 23
europaeus Pradal 23
europaeus Thunbg. 27
exemptus Rey 12
eximius Pasc. 17

facietatus Gyll. 17
Fahraei Auriv. (Episus) 4
Fahraei Jek. (Micr.) 7
Fahraei Fåhrs. (Brach.) 17
fallax Fåhrs. 7
farctus Ill. 17
fascicularis Ol. 17
fascicularis Panz. 17
fasciculosus Germ. 17
Fausti Pasc. 22
ferox Fairm. 17
ferrugatus Quedf. 17
ferrugineus Ol. 13
fictus Gyll. 5
fimbriatus Desbr. 20
Fischeri Kolbe. 17
fissirostris Fairm. 7
flavonotatus Péring. 17
flavotuberosus Marshall 29
flexuosus Boh. (Episus) 5
flexuosus Marshall (Broth.) 30
fluctiger Gyll. 13
formidulosus Gyll. 17
fossilis Auriv. 7
foveicollis Gyll. 21
foveifrons Bedel 17
foveolatus Péring. 17
frater Marshall 29
frontalis Fåhrs. 19
fuliginosus Gyll. 17

ganglionicus Boh. 5
gemmatus Ol. 17
gemmatus Thunbg. 26
gemmeus Gyll. 18
gemmosus Gyll. 21
gemmifer Germ. 18
gibbosus Auriv. 5
glabratus Wiedem. 18
glanduliferus Gyll. 18
globiferus Thunbg. 18
globosus Drury 18
granicollis Gyll. 18
graniferus Fåhrs. 18
granirostris Fåhrs. 18
granosus Gyll. 18
granulatus Lacord. 18
gravida Pasc. 10
gravidus Auriv. 5
gravis Fåhrs. 18
grisescens Gyll. 7
griseus F. 18
gryphus Pasc. 18
guineensis Péring. 18
Gyllenhali Gyll. 18

haedus Gyll. 18
hieroglyphicus Fåhrs. 5
hilaris Péring. 18
hispidus Desbr. 27
Hofmanni Faust 18
honorabilis Brancs. 18
Hopei Boh. (Episus) 5
Hopei Boh. (Synth.) 29
hottentottus Gyll. 16
humeralis Péring. 17
hybridus Fåhrs. 18
hypocritus Gyll. (Episus) 5
hypocritus Fåhrs. (Brach.) 18
hypocritus Bedel (Brach.) 14
hystrix Schoenh. 18

idolum Gyll. 8
ignavus Fåhrs. 19
impendens Fåhrs. 19
impius Fåhrs. 19
impressicollis Auriv. (Episus) 4
impressicollis Péring. (Brach.) 19
impressifrons Gyll. 19
imprudens Gyll. 19
inaequalis Gyll. (Micr.) 8
inaequalis Thunbg. (Brach.) 19
inaequalis Ol. 26
incertus Desbr. 20
incommodus Péring. 19
incultus Gyll. 27
indutus Péring. 19
inermicollis Gyll. 5
infitialis Péring. 19
informis Chevr. 29
ingratus Fåhrs. 19
inops Péring. 19
inordinatus Fåhrs. 19
insignis Mill. 23
insignis Péring. 26
instabilis Fåhrs. 26
insularis Desbr. 20
intermedius Péring. 19

interpositus Hartm. 19
interpunctatus Gyll. 14
interruptus Rey 13
interstitialis Fåhrs. 19
interstitiopunctatus Auriv. 8
intutus Gyll. 19
inurbanus Gyll. 19

junix A. Lcht. 19
juvencus Sparrm. 20
juvencus Thunbg. 14
ixodicoides Péring. 20

kabylianus Desbr. 20
karooensis Péring. 20
khoikhoianus Péring. 20
Kirschi Jek. 8
Kirschi Auriv. 7
koroquanus Fåhrs. 16
Krebsi Auriv. 5
kumbanensis Quedf. 20

labruska Gyll. 20
Lacordairei Faust 20
lacunatus Latr. 27
laevifrons Fåhrs. 20
laevigatus Marshall 30
Lafertei Péring. 20
lateralis Gyll. 13
lateritius Gyll. 20
latifrons Gyll. 20
latipennis Fåhrs. 8
latro Gyll. 13
lentus Gyll. 14
levidipus Gyll. 20
libertinus Fåhrs. 13
lividicollis Fåhrs. 20
lobaticollis Péring. 20
longirostris Gyll. 20
longiusculus Gyll. 17
longulus Fairm. 20
loquax F. Hartm. 21
ludificator Auriv. 10
luridus Fåhrs. 21
luteus Wiedem. 21
lutosus Gyll. 15
lutulentus Gyll. 20
lyrae Vitale 27

maculatus Ol. 21
maculatus F. 16
maculicollis Péring. 12
maculipes Chevr. 21
maculosus Kirby 16
madagascariensis Schoenh. 21
madecassus Péring. 22
magus Auriv. 10
margaritaceus Germ. 26
margaritifer Gyll. 21
mashunus Marshall 29
mauritanicus Ol. 27
melancholicus Gyll. 8
mendosus Gyll. 5
milleporellus Bovie 14
milleporus Wiedem. 21
milleporus Gyll. 15
minor Voet 16
modestus Fåhrs. 21
moerens Pasc. 21
moestus Péring. 21
monachus Fåhrs. 21
morio F. 21
Mouffleti Péring. 21
muricatus Boh. (Episus) 5
muricatus F. 21
muricatus Ol. 12

namanus Péring. 21
namaqua Péring. 21
nanus Péring. 24
nanus Péring. 28
natalensis Fåhrs. 21
nebulosus Ol. 21
nigropictus Pasc. 29
nigrovittatus Auriv. 4
nodicollis Auriv. 5
nodiferus Gyll. 12
nodifrons Fåhrs. 22
nodulosus Fåhrs. 22
nodulosus Reiche 20
Normandi Desbr. 22
nubilus Desbr. 27
nudus Péring. 22

Oberthüri Auriv. 5
obesus F. 22
obesus Ol. 22
obliquus Jek. 4
oblongus Auriv. (Micr.) 8
oblongus Fåhrs. (Brach.) 22
obtusus Pasc. 22
occlusus Pasc. 30
ocellatus F. 22
ochreosignatus Fåhrs. 22
oculatus Guér. 23
oedematosus Sulz. 22
Olivieri Desbr. 20
opacus Woll. 23
opalinus Auriv. 5
orbipennis Reiche 20
ornatus Reiche 20
ornatus Drury 18
ovampoensis Marshall 29
ovatus Brullé 27
oxonchus Wiedem. 22

Papei Zaitzev 26
papillosus Thunbg. 15

papulosus Gyll. 22
paradoxus Rey (Brach.) 13
paradoxus Péring. (Synth.) 29
parallelus Auriv. 4
parcus Kolbe 22
parens Desbr. 14
parvus Péring. 29
Pascoei Jek. 8
paucidentatus Auriv. 4
peninsularis Chevr. 14
peregrinus Fåhrs. 22
Peringueyi Auriv. (Episus) 5
Peringueyi Auriv. (Prot.) 10
perodiosus Gyll. 12
perplexus Fåhrs. 23
Perrieri Fairm. 23
pertusus Thunbg. 23
petiolatus Fåhrs. 10
petulcus Gyll. 23
phlyctaenoides Pasc. 23
phrygianus Gyll. 23
phrynopterus Fairm. 23
picturatus Fåhrs. 23
pictus Germ. 23
piger Gyll. 23
pisifer Thunbg. 19
plagosus Péring. 29
planifrons Auriv. 8
planirostris Gyll. 12
planus Thunbg. 30
plicatus Gyll. 23
polymastulus Kolbe 23
polyophthalmus Gyll. 23
porcatus Marsham 30
posticus Gyll. 23
Pradieri Fairm. 23
praecisicollis Marshall 30
praecursor Pasc. 22
praemorsus Thunbg. 30
proletarius Péring. 23
pseudocancellatus Pape 23
pseudoscutellatus Fåhrs. 23
pterygomalis H. Luc. 16
pterygomalis Gyll. 27
puerilis Kolbe 24
pulvereus Gyll. 24
pulverulentus Ol. 15
pumilus Marshall (Brach.) 24
pumilus Marshall (Broth.) 30
punctatus Auriv. 6
punctulatus Ol. 22
pusio Wiedem. 30
pustulatus Faust 24
pustulosus Gyll. 24
pygmaeus Vitale 21

quadratus Voet 27
quadripennis Péring. 29
quadrisulcatus Fisch. 15
quadrulifer Jek. 6

racemus Gyll. 24
Raffrayi Chevr. 24
Raffrayi Desbr. 14
ramosus Schauf. 13
rectecostatus Desbr. 16
reflexus Gyll. 24
Reichei Roh. 29
Reinhardti Gyll. 24
reticulatus Wiedem. 24
reticulosus Gyll. 24
retusus F. 8
riguus Er. 24
rixator Pasc. 15
robustus Auriv. 6
Roelofsi Auriv. 6
rostratus F. 6
rostratus Ol. 4
rotundatus Auriv. (Micr.) 8
rotundatus Péring. (Brach.) 24
rotundicollis Auriv. 6
rubiginosus Gyll. 24
rudis Gyll. 24
rugipes Gyll. 24
rugosus Thunbg. 24
rugulosus Gyll. 24
rusticanus Gyll. 24

sacer Latr. 24
saginatus Gyll. 24
sagittarius Péring. 29
salamensis Kolbe 24
saxosus Gyll. 14
scabiosus Gyll. 24
scabrosus Ol. 15
scalaris F. 24
scalaris Ol. 22
scelestus Gyll. 24
Schalowi Quedf. 24
Schoenherri Péring. 25
scoposus Gyll. 25
scrobicollis Gyll. 24
scrobiculatus Gyll. 25
scrobipennis Fåhrs. 25
scrobirostris Gyll. 14
scrupulosus Gyll. 25
sculpturatus Fåhrs. 25
scutellaris H. Luc. 25
scutipennis Desbr. 23
scutirostris Germ. 25
semiaeneus Desbr. 12
semiocellatus Gyll. 25
semituberculatus H. Luc. 14
sericeus Desbr. 27
seriedentatus Fairm. 25

serratus Thunbg. 25
serratus Ol. 27
setiger Gyll. 25
setipennis Fåhrs. 25
setosus Wiedem. 25
severus Fåhrs. 25
siculus Gyll. 20
signatus Péring. 25
simulator Dalm. 6
sinuatus Ol. (Brach.) 20
sinuatus Marshall (Synth.) 29
socors Fåhrs. 25
sordidus Pasc. (Broth.) 30
sordidus Péring. (Synth.) 29
Sparrmani Gyll. 25
sparsipes Gyll. 12
speciosus Péring. 28
spectator Fåhrs. 10
spectrum F. (Gyllenh.) 9
spectrum Thunbg. (Brach.) 14
spilopterus Wiedem. 15
spinicollis Bedel 25
spiniger Gerst. (Micr.) 8
spiniger F. (Brach.) 25
spinipes Péring. 25
spinirostris Ol. 16
spinosus Boh. 6
spissus Auriv. (Micr.) 8
spissus Gyll. (Brach.) 25
sputatilius Gyll. 6
squalidus Fåhrs. 25
squamosus Péring. 25
stellaris Ol. 25
stellaris Gyll. 12
sticticus Voet 25
sticticus Fåhrs. 28
stolatus Pasc. 29
stricticollis Jek. 3
strumosus Pasc. 25
subcaudatus Gerst. 8
subfasciatus Gyll. 6
subvariolatus Desbr. 27
subverrucosus Fåhrs. 26
subverrucosus Fåhrs. 28
sulcaticeps Kolbe 26
sulcicollis Hartm. 26
sulcifrons Auriv. (Micr.) 7
sulcifrons Gyll. (Brach.) 12
superciliosus Gyll. 23
superciliosus Gyll. 15
suspiciosus Gyll. 25
suturalis Péring. 26
suturalis Pasc. 17

taeniatus Thunbg. 28
T-album Jek. 6
tauriculus Sparrm. 26
tauricus Desbr. 20
tenebrosus Gyll. 26
tenuis Fairm. 6
tergosignatus Gyll. 26
tessellatus Gyll. 13
tetanicus H. Luc. 23
texatus Gyll. 26
Thunbergi Boh. (Episus) 6
Thunbergi Gyll. (Brach.) 19
torvus Gyll. 26
transversefoveatus Péring. 26
transversus Ol. 26
tremens Fåhrs. 26
truncatus Boh. (Episus) 6
truncatus Boh. (Synth.) 29
tuberculatus Geer 22
tuberifrons Fairm. 9
tuberosus Gerst. (Episus) 6
tuberosus Wiedem. (Brach.) 26
turbatus Pasc. 26
turgidus Gyll. 26
turriferus Gyll. 26
tursio Pasc. 26
tutanus Jek. 9

ulcerosus Gyll. 26
umbrinus Fåhrs. 26
undatus F. 26
ungulatus Gyll. 14
uva Sparrm. 27
uva Thunbg. 20
uva Gyll. 24
uvula Kolbe 27
vacca Thunbg. 27
vagabundus Fåhrs. 28
variegatus Pape 28
variipictus Quedf. 28
variolosus Ol. 28
variolosus Thunbg. 14
varius Péring. 28
velutinus Desbr. 20
ventralis Desbr. 21
venustus Wiedem. 28
vermiculatus Fairm. 9
verrucifer Kirby 28
verrucipennis Gyll. 28
verrucosiusculus Pape 28
verrucosus Ol. 28
vespertilio Desbr. 23
vestitus Gyll. 28
viduatus Péring. 28

Wahlbergi Fåhrs. (Brach.) 28
Wahlbergi Jek. (Episus) 4
Wardeni Péring. 29
Westermanni Auriv. (Episus) 6
Westermanni Fåhrs. (Brach.) 28

Zeyheri Gyll. 28

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 116:

S. Schenkling et G. A. K. Marshall

Curculionidae:
Dinomorphinae, Somatodinae,
Amycterinae, Gonipterinae.

W. Junk
Berlin W 15.
30. III. 1931.